

Lisätietoja: Helena Korpi (09) 1734 3605, Hilikka Ahonen (09) 1734 3249  
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


## Miesten itsemurhat ja alkoholikuolemat vähenevät edelleen

Viime vuonna itsemurhan teki 824 miestä, joista 83 prosenttia oli työikäisiä eli 15-64-vuotiaita. Työikäisten miesten itsemurhien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 16 prosenttia. Työikäisten miesten yleisin kuolemansyö oli sepelvaltimotauti ja naisten rintasyöpä. Toisella sijalla sekä miehillä että naisilla oli alkoholiperäinen kuolemansyö. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyötilastosta.

Viime vuonna miesten itsemurhien määrä laski samalle tasolle, joka vallitsi viimeksi 1960-luvun lopulla. Silti Suomessa miesten itsemurhakuolleisuus on huomattavan korkea verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin. Vuosikymmeniä jatkunut miesten itsemurhakuolleisuuden kasvu taittui jo 1990-luvun alussa lamaan, ja sama laskeva kehitys jatkuu yhä. Tämän on nähty olevan seurausta itsemurhien yleisimmän riskitekijän, masennustilan, parantuneesta hoidosta ja itsemurhien ehkäisyn tehostumisesta.

Alkoholin kulutuksen kasvun myötä alkoholisyistä johtuva kuolleisuus lisääntyi 1980-luvun alusta vuosituhanen vaihteeseen 50 prosenttia. 1990-luvun lopulla työikäisten miesten kuolleisuus alkoholisyihin ylitti itsemurhakuolleisuuden. Aivan viime vuosina miesten alkoholikuolleisuus on hienoisesti vähentynyt alkoholin kulutuksen jatkuvasta kasvusta huolimatta. Naisten alkoholi- ja itsemurhakuolleisuus on ollut yhtä suurta viimeiset viisi vuotta, mutta on yhä monin verroin alhaisempaa kuin miesten.

## Työikäisten itsemurha- ja alkoholikuolleisuus 1982 - 2002



## Naisten sepelvaltimotautikuolleisuus kasvussa

Suomalaisten kansantauti, sepelvaltimotauti, on hellittänyt otettaan työikäisistä miehistä. Naisilla sen sijaan suotuisa kehitys näyttää pysähtyneen 1990-luvun lopulla. Vuonna 2002 työikäisiä naisia kuoli sepelvaltimotautiin 233. Naisten sepelvaltimotautikuolleisuus on Euroopan keskitasoa, mutta suomalaisten miesten kuolleisuus sepelvaltimotautiin on vieläkin korkea. Viime vuonna joka viides työikäisen miehen kuolema aiheutui sepelvaltimotaudista.

Sepelvaltimotauti on ikääntyneen väestön yleisin kuolemansyy. Viime vuonna lähes joka kolmas 70 vuotta täyttänyt kuoli sepelvaltimotautiin. Dementian osuus kuolemansyyinä on väestön ikääntymisen myötä kasvanut: vuonna 2001 dementiaan kuoli 3 550 henkilöä, kun vuonna 2002 kuolleita oli jo 4 080.

## Työikäisten (15-64-vuotiaiden) yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan 2002

Miehet				Naiset			
Sija	Kuolemansyy	Kuolleiden määrä	%	Sija	Kuolemansyy	Kuolleiden määrä	%
1.	Sepelvaltimotauti	1 298	18,2	1.	Rintasyöpä	329	10,6
2.	Alkoholisytyt	980	13,7	2.	Alkoholisytyt	235	7,5
3.	Tapaturmat	888	12,4	3.	Sepelvaltimotauti	233	7,5
	siitä - maaliikenne	200	2,8				
	- kaatuminen	206	2,9				
4.	Itsemurhat	685	9,6	4.	Itsemurhat	226	7,3
5.	Keuhkosityöpä	376	5,3	5.	Tapaturmat	216	6,9
					siitä - maaliikenne	65	2,1
					- kaatuminen	35	1,1
6.	Aivoverenkierron sairaus	341	4,8	6.	Aivoverenkierron sairaus	210	6,7
	Muut kuolemansyyt	2582	36,1		Muut kuolemansyyt	1 666	53,5
	<b>Työikäisenä kuolleita miehiä yhteensä</b>	<b>7 150</b>	<b>100</b>		<b>Työikäisenä kuolleita naisia yhteensä</b>	<b>3 115</b>	<b>100</b>

Lähde: Kuolemansyyt 2002. Tilastokeskus.

Julkaisu ilmestyy viikolla 45. Lisätietoja kuolemansyistä Internetissä osoitteessa [statfin.stat.fi](http://statfin.stat.fi)